

*アメリカ小児一般（7-18歳）に奨励されている予防接種スケジュール

Figure 2: recommended immunization schedule for persons aged 7 through 18 years -United States, 2012

Vaccine 予防接種項目/Age 年齢	7-10 才	11-12 才	13-18 才
Tetanus, diphtheria, pertussis (ジフテリア・破傷風・百日咳)	1 dose (if indicated)	1 dose	1 dose (if indicated)
Human papillomavirus (ヒトパピロウイルス)	詳細CDC	3 dose	Complete 3-dose series
Meningococcal (髄膜炎)	詳細CDC	Dose 1	Booster at 16 years old
Influenza (インフルエンザ 2010 年以降)	Influenza (yearly)		
Pneumococcal (肺炎球菌)	詳細CDC		
Hepatitis A (A 型肝炎)	Complete 2-dose series		
Hepatitis B (B 型肝炎)	Complete 3-dose series		
Inactivated poliovirus (ポリオ)	Complete 3-dose series		
Measles, Mumps, Rubella (はしか・風疹・おたふく風邪)	Complete 2-dose series		
Varicella (水疱瘡)	Complete 2-dose series		

* 詳細は、米国予防接種情報：<http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/default.htm>

- Range of recommended ages for all children
すべての子供達のために推奨される年齢の範囲
- Range of recommended ages for certain hi-risk groups
特定のハイリスクグループに対する推奨年齢の範囲
- Range of recommended age for catch up immunization
予防接種のキャッチアップのための推奨年齢の範囲

- ・ポリオの予防接種に関しては CDC では 4 回目の接種を奨励していますが、NY 州の学校の入学に際しては 3 回の接種で問題はありません。
- ・インフルエンザの予防接種： 6 ヶ月児からそれ以上の年齢で毎年、乳児の近親者も毎年（初回は 9 歳以下は回接種する）
- ・水痘（Varicella）：初回は 1 才～1 才半、4 才～6 才までの間に 2 回目を奨励している。
- ・A 型肝炎：1 才以降 2 才までに 2 回（半年あける）
- ・髄膜炎菌：ハイリスク者は 2 才以降 10 才までに接種する。
- ・ヒトパピローウイルス：初回は 11 才～12 才 1 回目の 2 カ月後と 1 回目の 6 カ月後に接種。

* 予防接種スケジュールを接種回数で見た場合は下記のようになります。

予防接種／回数	初回	2回目	3回目	4回目	5回目
B型肝炎 HepB	出生時	1ヶ月～2ヶ月	6ヶ月～2才		
ロタウイルス RV	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月		
ジフテリア 破傷風 百日咳 DTaP	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	15ヶ月～18ヶ月	4才～6才 *11才で6回目、 その後10年毎に Tdを接種
Hib ワクチン Haemophilus Influenzae Type b (髄膜炎の予防)	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	1才～1才半	
肺炎球菌 PCV	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	1才～1才半	
ポリオ (IVP) (非経口)	2ヶ月	4ヶ月	6ヶ月～18ヶ月	4才～6才 (ハイリスク)	
インフルエンザ Influenza	初回は2回接種。6ヶ月以降6才まで毎年、乳児の近親者も毎年。ハイリスク児の親は6才以上でも毎年。				
はしか おたふく風邪 風疹 MMR	1才～1才半	4才～6才			
水痘 (Varicella)	1才～1才半	4才～6才までの間に2回目を奨励している。			
A型肝炎 HepA	1才以降2才までに2回(半年あける)				
髄膜炎 Meningococcal vaccination	2回の接種を11才から16才から18才までに奨励している。 ハイリスク者は2才以降10才までに Two doses of MCV4 are recommended for adolescents 11 through 18 years of age: the first dose at 11 or 12 years of age, with a booster dose at age 16.				
ヒトパピローマウイルス (HPV)	11才～12才	1回目の2ヶ月後	1回目の6ヶ月後		

*日本の予防接種スケジュールはこちらのサイトをご覧ください。

国立感染症研究所/ 感染症情報センター (IDSC/ Infectious Disease Surveillance center)

<http://idsc.nih.gov/j/vaccine/vaccine-j.html>